

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA URODYNAMICZNEGO

Badanie urodynamiczne obejmuje kompleksową ocenę czynności pęcherza moczowego i cewki moczowej. Wykonywane jest przy użyciu specjalnych cewników, które w trakcie badania wprowadza się przez cewkę moczową do pęcherza i przez odbyt do kiszki stolcowej. Badanie trwa ok 40 min. i nie jest bolesne.

Sposób przygotowania do badania

Dzień przed badaniem

Należy jeść lekkostrawne posiłki i pić płyny niegazowane. Wieczorem, przed badaniem, włożyć czopek glicerynowy do odbytu gdy brak efektu wykonać lewatywę (do kupienia w aptece gotowe wlewki) w celu opróżnienia kiszki stolcowej.

W dniu badania

Rano należy oddać mocz i stolec, wypić ok. 0,5 litra płynów i zjeść lekkostrawne śniadanie. Aby uzyskać wiarygodne wyniki badanie powinno być przeprowadzone przy pełnym pęcherzu nie należy zatem opróżniać pęcherza, do chwili badania o ile to możliwe- indywidualnie dla pacjenta, około 4 godzin.

Prosimy o zabranie aktualnych wyników badań (jeśli były wykonywane):

- ogólne moczu
- posiew moczu
- oceny czynności nerek (mocznik, kreatynina, kwas moczowy)
- USG narządu rodnego, nerek, tomografia układu moczowego, urografia (jeśli były wykonywane), inne
- wcześniejsze badania urodynamiczne